



แพทยสภา

The Medical Council of Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์

แพทยสภาร่วมสื่อสารความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

แนะเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาด

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดา ในภูมิภาคแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันออกจากเชื้อไวรัสอีโบล่าสายพันธุ์ Bundibugyo ซึ่งก่อโรครุนแรงและมีอัตราป่วยตายสูง และยังประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ โรคนี้เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 9 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปี พุทธศักราช 2559 และกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ กำหนดให้สาธารณสุขสองแห่งดังกล่าวเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าเป็นโรคติดต่ออันตรายที่สามารถแพร่กระจายผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่ง เลือด หรือสิ่งปนเปื้อนจากผู้ป่วย โดยผู้ติดเชื้อมักมีอาการไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ เจ็บคอ อาเจียน ท้องเสีย และในบางรายอาจมีภาวะเลือดออกผิดปกติ

ผู้ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐยูกันดา หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคอีโบล่า หากภายใน 21 วัน มีอาการไข้ อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ เจ็บคอ อาเจียน ท้องเสีย หรือมีเลือดออกผิดปกติ ขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางทันที

สำหรับสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้เฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่มีประวัติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเข้มงวด รวมถึงติดตามอาการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 21 วัน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในการติดตามผู้สัมผัสและควบคุมโรค

ทั้งนี้ หากพบบุคคลที่มีอาการสงสัยเข้าข่ายโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ขอให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทันที หรือภายใน 3 ชั่วโมงนับแต่พบผู้ป่วย โดยสามารถติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โทรศัพท์ 0 2590 3810

การรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง การเฝ้าระวังตนเอง และการแจ้งเหตุอย่างรวดเร็ว จะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคและสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมโดยรวม

“ร่วมกันเฝ้าระวัง รู้เท่าทัน และป้องกันโรค เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสังคม”

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2569

ที่มา: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



แพทยสภา



The Medical Council of Thailand



www.tmc.or.th



02-590-1886